



Имунизация срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2

ПРЕПОРЪКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ИМУНИЗАЦИИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19

1. Групи в риск от по-тежко протичане, повишен риск за хоспитализация и смъртен изход, както и лица, които са в повишен риск от заразяване, се препоръчва имунизация срещу COVID-19 на:

- *Лица на възраст на и над 60 години;*
- *Лица с хронични заболявания с повишен риск от тежко протичане на COVID-19 (напр. диабет, сърдечни заболявания, белодробни заболявания и др.), независимо от възрастта;*
- *Имунокомпрометирани лица (напр. лица с HIV, трансплантирани и др.), вкл. имунокомпрометирани деца на и над 6 месеца;*
- *Бременни жени;*
- *Медицински персонал;*
- *Потребители и персонал на социални институции.*

ПРЕПОРЪКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ИМУНИЗАЦИИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН

2. Имунизацията следва да се извърши с ваксина, насочена към подвариант LP.8.1 за осигуряване на защита срещу настоящите доминиращи и нововъзникващи щамове.
3. Имунокомпрометирани лица могат да получат допълнителна бустерна доза след 6 месечен интервал (две дози ваксина в рамките на 12 месеца).
4. Вариантна ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи, описани в точка 1, но е показано за имунизация.
5. При лицата от посочените групи е препоръчително и прилагането на ваксина срещу сезонен грип, едновременно или независимо от ваксинацията срещу COVID-19.
6. Лицата на и над 65 години, които не са имунизирани към момента, е препоръчително да бъдат ваксинирани и срещу инвазивни пневмококови заболявания.

ВАКСИНАТА СРЕЩУ LP.8.1 В БЪЛГАРИЯ

- **От 23.09.2025 г. стартира** имунизационната кампания срещу COVID-19 в страната с ваксината Comirnaty LP.8.1 за лица от 6 месечна възраст нагоре.
- лекарствена форма **COMIRNATY LP.8.1** за кърмачета и деца на възраст 6 месеца-4 години, за **разреждане, жълто капаче**
 - лекарствена форма **COMIRNATY LP.8.1** за деца на възраст 5-11 години, готова за употреба, **синьо капаче**
 - лекарствена форма **COMIRNATY LP.8.1** за лица над 12 години, готова за употреба, със **сиво капаче**

За кърмачета и деца на възраст 6 месеца до 4 години, за разреждане преди употреба.



LP.8.1
JN.1

За деца на 5 до 11 години, готова за употреба.



LP.8.1
JN.1

За лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба.



LP.8.1
JN.1

СЪХРАНЕНИЕ, РАЗРЕЖДАНЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ

Обем за инжектиране на една доза	0,3 ml	  
Разреждане	Да	
Количество разредител, необходимо за един флакон	1,1 ml физиологичен разтвор	
Дози в един флакон	3 дози:	6 дози:
Срок на съхранение в хладилник (2°C до 8°C)	10 седмици след размразяване	  
Използване на флакон след първото пробиване	12 часа	  

СХЕМА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- При лица от 5 години нагоре ваксината Comirnaty LP.8.1 се прилага за активна имунизация в **единична доза от 0,3 мл**, независимо от предишния ваксинационен статус за COVID-19.
- Необходимо условие за прилагане на ваксината при ваксинирани хора е да са изминали поне 3 месеца от датата на последно поставена ваксина срещу COVID-19.
- Имунокомпрометирани лица могат да получат допълнителна бустерна доза след 6 месечен интервал (две дози ваксина в рамките на 12 месеца).

СХЕМА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- При деца на възраст от 6 месеца до 4 години вкл., които са без данни за завършен курс на първична ваксинация срещу COVID-19 или предишна инфекция със SARS-CoV-2, ваксината се прилага като **първичен курс от 3 дози (0 – 3 седмици – 11 седмици)**.
- Ако едно дете навърши 5 години в интервала между приложението на дозите от първичния курс, то трябва да завърши първичния курс на имунизация от 3 дози.
- При деца на възраст от 6 месеца до 4 години вкл. с анамнеза за завършен курс на първична ваксинация срещу COVID-19 или предишна инфекция със SARS-CoV-2 се прилага **единична доза** не по-рано от 3 месеца от датата на последната поставена доза.

СХЕМА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- **При деца на възраст от 6 месеца до 4 години вкл.**, първичният курс при ваксинация с Comirnaty може да се състои от всеки един от използваните в миналото или понастоящем варианти на ваксината, но не трябва да се надвишава общия брой дози, изисквани като първичен курс.
- Първичният курс трябва да се прилага само веднъж.

Ваксините Comirnaty JN.1 и Comirnaty LP.8.1 са взаимозаменяеми.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ВАКСИНАТА СРЕЩУ LP.8.1

СТАРТИРА ИМУНИЗАЦИЯТА С НОВИТЕ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19

18.09.2025

Новини България



Стартира имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г. Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно.

Министърът на здравеопазването одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.

За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4 000 са за деца от 6 месеца до 11 години.

Информация за пунктовете по населени места:

Регионална здравна инспекция	Информация за локации
Благоевград	тук
Бургас	тук
Варна	тук
Велико Търново	тук
Видин	тук
Враца	тук
Габрово	тук
Добрич	тук
Кърджали	тук
Кюстендил	тук
Ловеч	тук
Монтана	тук
Пазарджик	тук
Перник	тук
Плевен	тук
Пловдив	тук
Разград	тук
Русе	тук
Силистра	тук
Сливен	тук
Смолян	тук
София-град	тук
София област	тук
Стара Загора	тук
Търговище	тук
Хасково	тук
Шумен	тук
Ямбол	тук

- имунизационни кабинети на РЗИ

- общопрактикуващи лекари

- лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, определени за целта